


Anwendung der transdermalen Thiamazol-Salbe

- 5 mg Thiamazol = 0,1 ml Salbe
- Dosierung: Beginn der Behandlung: Anwendung morgens und abends jeweils 0,05 ml Salbe abwechselnd ins rechte Ohr morgens und ins linke Ohr abends.

Transdermale Medikationen werden über die Haut der Katze in das Blut aufgenommen. Bitte, beachten Sie folgende Hinweise zur Applikation:

1. Schützen Sie Ihre Finger mit einem Handschuh / Fingerling, wenn Sie die Salbe auftragen.
2. Drücken Sie den verschriebenen Betrag an Salbe aus der Spritze auf Ihren geschützten Finger.
3. Tragen Sie die Salbe auf der Vorderseite (Innenseite) des Ohrs Ihrer Katze auf die Haut und reiben Sie die Salbe gut ein. Wechseln Sie von Mal zu Mal das Ohr (abwechselnd rechts und links).



4. Entfernen Sie den Handschuh und waschen Sie sich die Hände.
5. Es ist möglich, dass ein dünner Rückstand eingetrockneter Salbe von der letzten Anwendung zurückbleibt. Sollte dies der Fall sein, reinigen Sie das Ohr vor der Gabe der Salbe sanft mit einem Wattebausch oder einem Papiertuch.
6. Bewahren Sie die Salbe in den kleinen Spritzen vor Licht geschützt bei Zimmertemperatur auf. (Größere Container im Kühlschrank)